

## 5. Übung zur Approximationstheorie

Abgabe: Montag, 20. Dezember 2004, 12 Uhr

### Aufgabe 1 (4 Punkte)

Für  $\tau > 1$  sei  $f_\tau \in C_{2\pi}$  definiert durch

$$f_\tau(x) = \sum_{v=0}^{\infty} (v+1)^{-\tau} \cos(3^v x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass Konstanten  $M_1, M_2 > 0$  existieren, so dass

$$\frac{M_1}{(\log n)^{\tau-1}} \leq E_n(f_\tau) \leq \frac{M_2}{(\log n)^{\tau-1}}$$

für  $n \geq 3$  und  $\tau > 1$ .

### Aufgabe 2 (7 Punkte)

Beweisen Sie Lemma VI.9 der Vorlesung:

Sei  $X$  ein linearer normierter Raum. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i)  $X$  ist strikt konvex.
- (ii) Der Raum  $X$  ist **streng normiert**, d. h. aus  $f, g \neq 0$  und  $\|f+g\|_X = \|f\|_X + \|g\|_X$  folgt  $f = \gamma g$  für ein  $\gamma > 0$ .
- (iii) Der Rand der Einheitskugel, d. h. die Menge  $\{f \in X; \|f\|_X = 1\}$ , enthält keine nichttriviale Strecke.
- (iv) Aus  $f, g \in X$  mit  $f \neq g$  und  $\|f\|_X = \|g\|_X = 1$  folgt  $\|\alpha f + (1-\alpha)g\|_X < 1$  für alle  $\alpha \in (0, 1)$ .

### Aufgabe 3 (6 Punkte)

Beweisen Sie Lemma VI.10 der Vorlesung:

Sei  $X$  ein linearer normierter Raum. Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i)  $X$  ist gleichmäßig konvex.
- (ii) Zu beliebigen  $\varepsilon > 0$  und  $r > 0$  existiert ein  $\delta > 0$ , so dass für alle  $f, g \in X$  aus  $\|f\|_X < r + \delta$ ,  $\|g\|_X < r + \delta$  und  $\|f-g\|_X > \varepsilon$  stets  $\|f+g\|_X < 2r$  folgt.
- (iii) Für alle Folgen  $(f_n)_{n \geq 1}, (g_n)_{n \geq 1}$  in  $X$  folgt aus  $\|f_n\|_X < 1, \|g_n\|_X < 1$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n + g_n\|_X = 2$  stets  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - g_n\|_X = 0$ .

**Aufgabe 4** (2 + 2 Punkte)

Beweisen Sie Lemma VI.11 der Vorlesung:

Sei  $X$  ein linearer normierter Raum. Dann gilt:

- Ist  $X$  gleichmäßig konvex, so ist  $X$  strikt konvex.
- Ist  $X$  endlichdimensional und strikt konvex, dann ist  $X$  gleichmäßig konvex.

**Aufgabe 5** (2 Punkte)

Zeigen Sie, dass die Räume  $C[a, b]$  und  $L^1[a, b]$  nicht strikt konvex sind.

**Aufgabe 6** (2 + 4 + 1 Punkte)

Zeigen Sie, dass die folgenden Räume gleichmäßig und somit auch strikt konvex sind.

- Jeder Hilbertraum (*Hinweis*: Parallelogrammidentität).
- Zeigen Sie die Behauptung für eine der beiden folgenden Klassen von Räumen.
  - $L^p(a, b)$  für  $-\infty \leq a < b \leq \infty$ ,  $1 < p < \infty$  (Literatur: A. Schönhage, S. 43).
  - $\ell^p$  für  $1 < p < \infty$ , wobei

$$\ell^p = \left\{ x = (x_n)_{n \geq 1}; \|x\|_{\ell^p} := \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p} < \infty \right\}$$

(Literatur: Köthe, Topological vector spaces, §26.7).

- $(\mathbb{R}^n; \|\cdot\|_p)$  für  $1 < p < \infty$ .

**Aufgabe 7** (3 + 2 Punkte)

Für  $k \in \mathbb{N}$  sei  $X_k := (\mathbb{R}^2; \|\cdot\|_{1+1/k})$ , und der Raum  $Y$  sei definiert durch

$$Y = \left\{ y = (y_k)_{k \geq 1}; y_k \in X_k, \|y\|_Y := \left( \sum_{k=1}^{\infty} \|y_k\|_{X_k}^2 \right)^{1/2} < \infty \right\}.$$

Beweisen Sie, dass der Raum  $Y$

- strikt konvex ist.
- nicht gleichmäßig konvex ist.

*Hinweis*: Benutzen Sie in a) die strikte Konvexität der Räume  $X_k$  und  $\ell^2$  und wählen Sie in b) als Testpunkte auf dem Rand der Einheitskugel von  $Y$  die Punkte  $y^{(k)} := (0, \dots, 0, y_k, 0, \dots)$ ,  $z^{(k)} := (0, \dots, 0, z_k, 0, \dots)$  mit  $y_k = (1, 0) \in X_k$  und  $z_k = (0, 1) \in X_k$  für hinreichend großes  $k \in \mathbb{N}$ .